

Seguimiento y monitoreo de la deforestación en Colombia Primer trimestre de 2020

Bogotá, 1 de octubre de 2020

Con relación al reporte de monitoreo y seguimiento a la deforestación en el territorio nacional, correspondiente al primer trimestre de 2020 (Boletín número 22 de detecciones tempranas de deforestación), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se permite presentar los siguientes elementos de análisis e interpretación de los datos:

- El comportamiento de la deforestación relacionado con su aumento o reducción, no se reporta por meses, toda vez que su cálculo se construye a partir del análisis del comportamiento de este fenómeno en los doce meses del año. Conforme lo anterior, lo sucedido en el mes de febrero, apenas transcurridos dos meses de 2020, no representa la tendencia ni el comportamiento de este fenómeno durante todo el año. En tal sentido, el Ideam genera y publica la cifra de deforestación anual calculada para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada vigencia.
- Respecto al informe de la deforestación del primer trimestre de 2020, especialmente en el mes de febrero, es oportuno precisar que, gracias a la reacción inmediata y permanente de la fuerza pública, fue posible revertir esta tendencia, disminuyendo drásticamente en los meses siguientes hasta hoy, como lo muestra la gráfica que se anexa (figura 1), relacionada con las alertas de deforestación del Ideam.




Figura 1. Dinámica de las detecciones tempranas de deforestación semanales publicadas para Colombia. (Ideam, 2020).

- Estos eventos del mes de febrero correspondieron a la temporada seca del año y como se aprecia en la gráfica (figura 1), los picos de las alertas por deforestación durante la pandemia disminuyeron drásticamente y en la actualidad siguen siendo muy bajos.
- Para el segundo trimestre del año y lo corrido del tercer trimestre de este, se identifica una ostensible disminución de las detecciones tempranas de deforestación, principalmente en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.
- También se destaca que, para estos departamentos, en el segundo y tercer trimestre se reportaron semanas completas sin detecciones tempranas: Meta (13 semanas), Caquetá (7 semanas) y Guaviare (5 semanas).
- Los departamentos que concentran las mayores proporciones de detecciones en el año 2020 son Meta, Guaviare, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Chocó.
- Es importante mencionar que a partir de la segunda semana de marzo de 2020 se identifica un significativo descenso en las detecciones tempranas de deforestación hasta mediados del mes de agosto, principalmente en la Amazonia.
- Igualmente, también se identifica un significativo descenso en las detecciones tempranas durante el periodo del aislamiento preventivo por los efectos de la Pandemia COVID-19.