

INFORME EJECUTIVO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN DE LA MOJANA

MARZO 2026




Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad




COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2026

En febrero se da continuidad a la temporada seca en La Mojana. La climatología histórica indica que, sobre los municipios de San Jacinto del Cauca, Nechí, Achí y la mayor parte del municipio de Montecristo se presentan lluvias de entre 50 - 100 mm acumulados mensuales, solo en el extremo occidental de Montecristo las lluvias superan los 100 mm mensuales los más altos de la región durante este momento del año. Para el resto de los municipios de La Mojana las lluvias acumuladas mensuales están por debajo de los 50 mm.


Durante el mes de febrero de 2026 se registró un aumento de las precipitaciones muy por encima del histórico climático de La Mojana. A causa de eventos meteorológicos anómalos fuertemente influenciado por un frente frío desde el norte que afectó el caribe colombiano tuvimos un febrero más lluvioso de lo usual en la región en general. Las mayores precipitaciones se registraron en la primera semana del mes, las zonas con más lluvias corresponden a los municipios de Nechí, San Jacinto del Cauca, Guaranda, Majagual, Achí y Montecristo con tres veces más de precipitación de lo que indica la normal climática (>200 mm), para el resto del territorio Mojanero se percibieron el doble de lluvias por encima de la climatología histórica.



Climatología febrero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026



Precipitación acumulada 01/02/2026 - 28/02/2026
Fuente: CRPA de La Mojana, 2026



**Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad**




PREDICCIÓN CLIMÁTICA


MARZO

Marzo es el final de la temporada seca en La Mojana. La climatología histórica indica que, sobre los municipios de Montecristo y oriente de Nechí se presentan lluvias de entre 150 - 200 mm acumulados mensuales; en San Jacinto del Cauca, Achí, sur de Guaranda y la mayor parte de Nechí se prevén lluvias entre 100 -150 mm; en Majagual, Pinillos, la mayor parte del Ayapel, oriente de Sucre, norte de Guaranda, occidente de Nechí y oriente de Sucre se esperan lluvias entre 50 -100 mm; la zona que menos lluvias recibe en marzo en San Benito Abad, Caimito, norte de Ayapel, San Marcos y occidente de Sucre lluvias de 0 -50 mm mensuales acumulados.



Para marzo de 2026, la predicción del modelaje realizado por el IDEAM muestra más lluvias para La Mojana en esta época del año. Se prevén hasta 100 mm más de precipitación mensual acumulada en el oriente de Sucre donde limitan el sur de Magangué, el occidente de Pinillos y el norte de Achí, así como también San Jacinto del Cauca y la mayor parte norte de Montecristo. Para las otras zonas de la ecorregión pueden presentarse lluvias de entre 10 a 25 mm por encima de la climatología histórica. En general se estima un marzo más lluvioso de acuerdo a la climatología característica durante esta época del año.



Climatología marzo (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026



Anomalía de precipitación para el mes de marzo de 2026. Fuente: IDEAM, 2026



Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad





PREDICCIÓN CLIMÁTICA

ABRIL

El mes de abril en la región es un período de transición entre la temporada seca y la lluviosa. Los volúmenes de lluvia medios en el mes presentan una distribución espacial en donde aumentan desde el Noroccidente al Suroriente, observándose la menor precipitación al norte del municipio de Magangué y San Benito Abad con lluvia media entre los 50-100 mm y las áreas más lluviosas en Montecristo, suroriente de Nechí y San Jacinto del Cauca con volúmenes medios entre los 300-600 mm de lluvia.

De acuerdo con la predicción climática realizada por el IDEAM para el mes de abril de 2026 se prevé que los volúmenes de precipitación estén por debajo de lo normal en comparación con la climatología histórica en esta época del año. Se estima que se presenten menos lluvias en el norte de Achí donde puede haber un déficit de hasta 80 mm menos de precipitación. Para las zonas de Majagual, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, San Benito Abad y oriente de Nechí, se prevén entre 20 a 50 mm menos de lluvias. Mientras que para zonas del norte de San Benito Abad y Sucre, Montecristo y oriente de San Jacinto del Cauca y Nechí se estiman aumentos de precipitación entre 20 y 40 mm de lluvia acumulada mensual. En general se estima un marzo con tendencia a menos lluvias para la mayor parte del territorio Mojanero de acuerdo con la climatología característica durante esta época del año.



Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad



EL EQUIPO DE TRABAJO CENTRO REGIONAL DE PRONÓSTICO Y ALERTAS TEMPRANAS DE LA MOJANA

CRPA LA MOJANA

crpalamojana@ideam.gov.co

FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua

<https://www.fiducoldex.com.co/negocios-fiduciarios/fondo-para-la-vida-y-la-biodiversidad>

IDEAM

www.ideam.gov.co/

Correo electrónico:
servicio@ideam.gov.co

Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.

CORPOMOJANA

<http://www.corpomojana.gov.co/>

Correo electrónico:
corpomojana@corpomojana.gov.co

Teléfono: (+575) 295 5347

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible \(minambiente.gov.co\)](http://Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co))

PNUD

[El PNUD en Colombia \(undp.org\)](http://El PNUD en Colombia (undp.org))

FONDO ADAPTACIÓN

